

CUADRO 11. FARMACOS ANTIHIPERTENSIVOS INTRAVENOSOS UTILIZADOS EN LA CRISIS HIPERTENSIVA EN LA PREECLAMPSIA SEVERA > 160/110 MM/HG.

MEDICAMENTO	DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION	EFFECTOS ADVERSOS	TIEMPO DE INICIO	PICO MAXIMO	DURACION	FDA
Labetalol Primera linea	20 mg en bolo hasta 40 mg cada 10 a 15 minutos, o en infusion 1 a 2 mg/minuto. Dosis máxima: 220 mg	Nausea, vomito, bradicardia neonatal.	5 minutos	30 minutos	4 horas	C
Nifedipina Primera linea	10 mg VO cada 10-15 minutos. Dosis máxima: 50 mg	Uteroinhibicion, hipotension, taquicardia, cefalea.	5-10 minutos	30 minutos	6 horas	C
Hidralazina Segunda linea	5-10 mg en bolos o infusion a 0.5-10 mg por hora. Dosis máxima: 30 mg	Cefalea, taquicardia, nausea, vomito e hipotension.	5 minutos	30 minutos	45 minutos	C

Tomado de : MAGEE L, L, Clinical Practice Guideline Diagnosis, Evaluation and Management of the Hypertensive Disorders of Pregnancy, 2014